



ยารักษากลุ่มอาการทางระบบ
ไหลเวียนโลหิต (แก้ลม)



- ยาหอมหมายถึงยา**ปรับการทำงาน**ของ**ลม**ที่เคลื่อนไหวทั่วร่างกายซึ่ง**ส่งผลต่อจิตใจ** อารมณ์**ความรู้สึก** การ**หมุนเวียน**ของ**เลือด**

- ยาหอมบางชนิดนอกจากใช้**บำรุงหัวใจ**แล้ว ยังใช้สำหรับ**แก้ไข้**และ**แก้อาการจุกเสียดแน่นท้อง**



๑. ยารักษากลุ่มอาการทางระบบไหลเวียนโลหิต

- ยาหอมทิพโอสถ ยาหอมเทพจิตร ยาหอมนวโกธู
 - ยาหอมแก้ลมวิงเวียน และยาหอมอินทจักร์
-
- รูปแบบยา : ยาผง ยาเม็ด

ยารักษากลุ่มอาการทางระบบไหลเวียนโลหิต (แก้ลม)

ยาหอมทิพโอสถ



ข้อบ่งใช้

แก้ลมวิงเวียน

ขนาดและวิธีใช้

ชนิดผง รับประทานครั้งละ 1-1.4 กรัม ละลายน้ำกระสายยา (น้ำดอกไม้อ่อนหรือน้ำสุก) เมื่อมีอาการทุก 3-4 ชั่วโมง ไม่ควรเกินวันละ 3 ครั้ง

ข้อห้าม

-

ข้อควรระวัง

ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)

ยารักษากลุ่มอาการทางระบบไหลเวียนโลหิต (แก้ลม)

ยาหอมเทพจิตร



ข้อบ่งใช้

แก้ลมกองละเอียด ได้แก่ อาการหน้ามืด ตาลาย สวิงสวาย (อาการรู้สึกใจหวิววิงเวียนคลื่นไส้ ตาพร่าจะเป็นลม) ใจสั่น บำรุงดวงจิตให้ชุ่มชื่น

ขนาดและวิธีใช้

ชนิดผงหรือเม็ด รับประทานครั้งละ 1-1.4 กรัม ละลายน้ำ กระจายยา (น้ำดอกไม้น้ำหรือน้ำสุก) เมื่อมีอาการทุก 3-4 ชั่วโมง ไม่ควรเกินวันละ 3 ครั้ง

ข้อห้าม

-

ข้อควรระวัง

การรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets) ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับ ไตเนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้

ยารักษากลุ่มอาการทางระบบไหลเวียนโลหิต (แก้ลม)

ยาหอมνωโกฐ



ข้อบ่งใช้

แก้ลมวิงเวียน คลื่นเหียน อาเจียน ในผู้สูงอายุ
แก้ลมปลายไข้(หลังจากฟื้นไข้แล้วยังมีอาการ เช่น
คลื่นเหียน วิงเวียน เบื่ออาหาร ท้องอืดและ
อ่อนเพลีย)

ขนาดและ วิธีใช้

ชนิดผงหรือเม็ด รับประทานครั้งละ 1-2 กรัม
ทุก 3-4 ชั่วโมงไม่ควรเกินวันละ 3 ครั้ง

ข้อห้าม

ห้ามใช้ในสตรีตั้งครรภ์และผู้ที่มีไข้

ข้อควรระวัง

การรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็น
ลิ่ม(anticoagulant) และยาต้านการจับตัวของ
เกล็ดเลือด(antiplatelets)

ยารักษากลุ่มอาการทางระบบไหลเวียนโลหิต (แก้ลม)

ยาหอมแก้ลมวิงเวียน



ข้อบ่งใช้

แก้ลมวิงเวียน อ่อนเพลีย นอนไม่หลับ

ขนาดและ

ยาผงหรือยาเม็ด รับประทานครั้งละ

วิธีใช้

600 มิลลิกรัม - 1 กรัม เมื่อมีอาการทุก 3-4 ชั่วโมง
ไม่ควรเกินวันละ 3 ครั้ง

ข้อห้าม

ห้ามใช้ในสตรีตั้งครรภ์และผู้ที่มีไข้

ข้อควรระวัง

การรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือด
เป็นลิ่ม(anticoagulant) และยาต้านการจับ
ตัวของเกล็ดเลือด(antiplatelets)
ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้เกสรดอกไม้

ยารักษากลุ่มอาการทางระบบไหลเวียนโลหิต (แก้ลม)

ยาหอมอินทจักร



ข้อบ่งใช้

แก้ลมบาดทะจิต แก้คลื่นเหียนอาเจียน แก้ลมจุกเสียด

ขนาดและ วิธีใช้

ยาผงหรือยาเม็ด รับประทานครั้งละ 600 มิลลิกรัม- 1 กรัม เมื่อมีอาการทุก 3-4 ชั่วโมง ไม่ควรเกินวันละ 3 ครั้ง รับประทานผงให้ละลายน้ำกระสายยาแก้ลมบาดทะจิต ให้ใช้น้ำดอกมะลิ แก้คลื่นเหียนอาเจียน ให้ใช้น้ำลูกผักชี เทียนดำต้ม แก้ลมจุกเสียดให้ใช้น้ำขิงต้ม

ข้อห้าม

ห้ามใช้ในสตรีตั้งครรภ์

ข้อควรระวัง

การรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets) ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้เกสรดอกไม้