




ยารักษากลุ่มอาการ  
ทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา



### ๓. ยารักษากลุ่มอาการทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

- รูปแบบยา: ยาแคปซูล ยามวง ยาเม็ด ยาลูกกลอน



ยาประสะไพล ยาปลุกไฟธาตุ  
ยาไฟประลัยกัลป์ ยาไฟห้ำกอง  
ยาเลือดงาม  
ยาสตรีหลังคลอด

# ยารักษากลุ่มอาการทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

## ยาประสะไพโร



### ข้อบ่งใช้

ระดูมาไม่สม่ำเสมอหรือมาน้อยกว่าปกติบรรเทาอาการปวดประจำเดือนขับน้ำคาวปลาในหญิงหลังคลอดบุตร

### ขนาดและวิธีใช้

ยาผง ยาเม็ด

1. กรณีระดูมาไม่สม่ำเสมอหรือมาน้อยกว่าปกติ
  - ก. ชนิดผงรับประทานครั้งละ 1 กรัม ละลายน้ำสุก วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร เป็นเวลา 3 - 5 วัน เมื่อระดูมา ให้หยุดรับประทาน
  - ข. ชนิดแคปซูล ชนิดเม็ด ชนิดลูกกลอน รับประทานครั้งละ 1 กรัม วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร เป็นเวลา 3 - 5 วัน เมื่อระดูมา ให้หยุดรับประทาน

# ยารักษากลุ่มอาการทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

## ยาประสะไพโร



### ขนาดและวิธีใช้

#### 2. กรณีปวดประจำเดือน

ในกรณีที่มีอาการปวดประจำเดือนเป็นประจำ ให้รับประทานยา ก่อนมีประจำเดือน 2 - 3 วันไปจนถึงวันแรกและวันที่สองที่มีประจำเดือน

ก. ชนิดผง รับประทานครั้งละ 1 กรัม ละลายน้ำสุก วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร

ข. ชนิดแคปซูล ชนิดเม็ด ชนิดลูกกลอนรับประทานครั้งละ 1 กรัม วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร

#### 3. กรณีขับน้ำคาวปลาในหญิงหลังคลอดบุตร

ก. ชนิดผง รับประทานครั้งละ 1 กรัม ละลายน้ำสุก วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร ให้รับประทานจนกว่าน้ำคาวปลาจะหมด แต่ไม่เกิน 15 วัน

ข. ชนิดลูกกลอน ชนิดเม็ด ชนิดแคปซูล รับประทานครั้งละ 1 กรัม วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร ให้รับประทานจนกว่าน้ำคาวปลาจะหมด แต่ไม่เกิน 15 วัน

# ยารักษากลุ่มอาการทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

## ยาประสะไพโร



### ข้อห้าม

- ก. ห้ามใช้ในหญิงตกเลือดหลังคลอด หญิงตั้งครรภ์ และผู้มีไข้
- ข. ห้ามรับประทานในหญิงที่มีระดูมากกว่าปกติ เพราะจะทำให้มีการขับระดูออกมามากขึ้น

### ข้อควรระวัง

- ก. ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับ ไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบวมและเกิดพิษได้
- ข. กรณีระดูมาไม่สม่ำเสมอหรือมาน้อยกว่าปกติ ไม่ควรใช้ติดต่อกันนานเกิน 1 เดือน
- ค. กรณีขับน้ำคาวปลาในหญิงหลังคลอดบุตร ไม่ควรใช้ติดต่อกันนานเกิน 15 วัน

# ยารักษากลุ่มอาการทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

## ยาปลูกไฟธาตุ



### ข้อบ่งใช้

บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ

### ขนาดและวิธีใช้

กระตุ้นน้ำนม กระจายเลือดลมในหญิงหลังคลอด  
ขนาดและวิธีใช้ รับประทานครั้งละ 500 มิลลิกรัม  
– 1.5 กรัม วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร

### ข้อห้าม

ห้ามใช้ในหญิงตกเลือดหลังคลอด หญิงตั้งครรภ์  
และผู้ที่มีไข้

### ข้อควรระวัง

ควรระวังการใช้ ร่วมกับยา phenytoin, propranolol,  
theophylline และ rifampicin เนื่องจากตำรับนี้มี  
พริกไทยในปริมาณสูง

อาการไม่พึงประสงค์ แสบร้อนยอดอก

ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

แพทย์แผนไทยดั้งเดิม ใช้เป็นยาแทนการอยู่ไฟของหญิงหลังคลอด

# ยารักษากลุ่มอาการทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

## ยาไฟประลัยกัลป์



### ข้อบ่งใช้

ขับน้ำคาวปลาในเรื้อนไฟ ช่วยให้มีมดลูกเข้าอู่

### ขนาดและวิธีใช้

- ก. ยาผง ยาเม็ดรับประทานครั้งละ 1 กรัม ละลายน้ำสุก วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร รับประทานจนกว่าน้ำคาวปลาจะหมด แต่ไม่เกิน 15 วัน
- ข. ชนิดเม็ด และชนิดแคปซูลรับประทานครั้งละ 1 กรัม วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร รับประทานจนกว่าน้ำคาวปลาจะหมด แต่ไม่เกิน 15 วัน

### ข้อห้าม

- ก. ห้ามใช้ในหญิงตกเลือดหลังคลอด หญิงตั้งครรภ์ และผู้มีไข้
- ข. ห้ามใช้ในหญิงที่ผ่าคลอด เนื่องจากทำให้แผลหายช้า

### ข้อควรระวัง

ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับ ไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของ การบูรและเกิดพิษได้

# ยารักษากลุ่มอาการทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

## ยาไฟห้ากอง

ช่วยมดลูกเข้าอู่



### ข้อบ่งใช้

ขับน้ำคาวปลาในเรื้อนไฟ ช่วยให้มีมดลูกเข้าอู่

### ขนาดและวิธีใช้

- ก. ยาผง ยาเม็ด รับประทานครั้งละ 1 – 1.5 กรัม ละลายน้ำสุก วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร ให้รับประทานจนกว่าน้ำคาวปลาจะหมด แต่ไม่เกิน 15 วัน
- ข. ชนิดเม็ดและชนิดแคปซูลรับประทานครั้งละ 1 – 1.5 กรัม วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร ให้รับประทานจนกว่าน้ำคาวปลาจะหมด แต่ไม่เกิน 15 วัน

### ข้อห้าม

- ก. ห้ามใช้ในหญิงตกเลือดหลังคลอด หญิงตั้งครรภ์ และผู้มีไข้
- ข. ห้ามใช้หญิงที่ผ่าคลอด เนื่องจากทำให้แผลหายช้า

### ข้อควรระวัง

-



# ยารักษากลุ่มอาการทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

## ยาเลือดงาม



<b>ข้อบ่งใช้</b>	บรรเทาอาการปวดประจำเดือน ช่วยให้ประจำเดือนมาเป็นปกติ แก้มตุ๋น
<b>ขนาดและวิธีใช้</b>	ก. ยาผง ยาเม็ดรับประทานครั้งละ 1 – 2 กรัม ละลายน้ำสุก วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร ข. ชนิดแคปซูลรับประทานครั้งละ 1 – 2 กรัม วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร
<b>ข้อห้าม</b>	ห้ามใช้ในหญิงตกเลือดหลังคลอด หญิงตั้งครรภ์ และผู้มีไข้
<b>ข้อควรระวัง</b>	ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับ ไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้

# ยารักษากลุ่มอาการทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

## ยาสตรีหลังคลอด



ยาต้ม

สูตรตำรับ ในยา 130 กรัม ประกอบด้วย

ก. แก่นแกแล แก่นขหนูน ว่านชักมดลูก แก่นฝางเสน  
เถาสะค้าน รากเจตมูลเพลิงแดง ดอกดีปลี  
โกศเซียง เถากำแพงเจ็ดชั้น หนักสิ่งละ 10 กรัม

ข. พริกไทยล่อน รากข้าวปลู ดอกคำฝอย ดอกมะลิ  
ดอกพิบูล ดอกบุนนาค ดอกสารภี เกสรบัวหลวง  
หนักสิ่งละ 5 กรัม

# ยารักษากลุ่มอาการทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

## ยาสตรีหลังคลอด



ข้อบ่งใช้

ขับน้ำคาวปลา บำรุงเลือด ช่วยให้มดลูกเข้าอู่เร็วในหญิงหลังคลอด

ขนาดและวิธีใช้

ขนาดและวิธีใช้ นำยาใส่น้ำพอท่วม ต้มด้วยไฟปานกลาง นานครึ่งชั่วโมง นำเฉพาะส่วนน้ำมารับประทาน ครั้งละ 250 มิลลิลิตร วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร หรือดื่มแทนน้ำ รับประทานติดต่อกัน 1 สัปดาห์หรือจนกว่าน้ำคาวปลาจะหมด แต่ไม่เกิน 15 วัน

# ยารักษากลุ่มอาการทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

## ยาสตรีหลังคลอด



### ข้อห้าม

ห้ามใช้ในหญิงตกเลือดหลังคลอด หญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มิใช่

### ข้อควรระวัง

- ก. ควรระวังในการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)
- ข. ควรระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่แพ้ละอองเกสรดอกไม้

### ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

- ก. แพทย์แผนไทยดั้งเดิม ใช้เป็นยาแทนการอยู่ไฟของหญิงหลังคลอด
- ข. ยา 1 ห่อ ใช้ติดต่อกันประมาณ 5 - 7 วัน โดยให้อุ่นน้ำสมุนไพรทุกครั้งก่อนการรับประทานยา